

経鼻内視鏡の予約表 検査の注意事項

様

検査項目	☐ 胃経鼻内視鏡検査
検査日時	年 月 日() 午前・午後 時 分から

*** 予約時間の10分前にこの用紙を再診窓口に出してください。**

経鼻法は従来の経口法と異なり、鼻から内視鏡を挿入する事で嘔吐反射が出にくく、また検査中に会話が可能となります。経口法と比べ苦痛が少ないため普及しつつありますが、あくまでもスクリーニングを目的としての使用が主体であり、悪性が疑われる場合や精密検査を要する場合などは従来の経口法が必要な場合があります。

内視鏡挿入前に鼻の麻酔を行います。その際鼻に違和感もしくは痛みを感じる事があります。鼻腔が狭いために内視鏡が挿入できない場合がまれにあり、その場合は口から挿入して検査をします。検査後に鼻出血を起こす事がまれにあり(頻度は3~4%)ですが、殆どの鼻出血は鼻の圧迫などで簡単に止まる軽いものです。

《検査の注意事項》

- * 心臓疾患、脳疾患、前立腺肥大、緑内障、アレルギー体質の方はお申し出下さい。
- * 内服されている薬がある場合ご相談下さい。(血圧、糖尿、抗血栓薬など)
抗凝固薬などを内服されている方は、検査前に内服を中止していただくことになっております。
- * 鼻の手術をされた方、耳鼻科疾患のある方はお申し出下さい。

前日の注意点


- * 夕食は普通にとり、夜9時以降は検査が終わるまで絶食としてください。
- * 飲酒はしないで下さい。

当日の注意点

- * 朝食は食べないで下さい。
- * 朝、コップ1杯程度の水またはお茶を飲んでください。

その他

- * 検査時に所見が認められた場合、粘膜の一部を採取する事があります。
- * 検査終了後はしばらくの間、車の運転ができませんので公共交通機関でお越し下さい。
- * 胃の動きを抑える注射をされた方は、目がかすんだり、のどが渇いたり、尿が出にくくなる事がありますが、1~2時間で治ります。
- * 検査後麻酔が切れるまで、観察のみの方は1時間、組織検査をした方は2時間食べたり飲んだりしないで下さい。
- * 検査直後は、鼻出血を起こさないよう、強く鼻をかまないようにして下さい。
- * 都合により予約日や予約時間に来院できない方は前もってご連絡下さい。



ブラザー記念病院

名古屋市瑞穂区塩入町11-8

電話 824-2875

- ・名鉄名古屋本線「堀田」駅から徒歩3分
- ・地下鉄名城線「堀田」駅から徒歩3分(1番出口)
- ・市バス「名鉄堀田」「地下鉄堀田」停留所から徒歩3分